

POUR SUIVRE L'ACTUALITÉ DE VOTRE PROFESSION

ortho

autrement

N°56 • AVRIL-MAI 2024 • 30 €

CLINIQUE

**Rééducation
Myofonctionnelle
Orofaciale :
isolée ou intégrée**

CLINIQUE

**La langue aux
avant-postes**

© Marc Schwartz



CLINIQUE
CATHERINE THIBAULT
 Orthophoniste
 spécialiste de la sphère orofaciale

La langue aux avant-postes


La prise en charge orthophonique de la sphère orofaciale se focalise forcément sur la langue. Mais cet organe, complexe, n'est pas qu'une somme de muscles à rééduquer. Catherine Thibault insiste : l'approche globale de l'enfant est impérative pour (re) trouver une oralité équilibrée. C'est son cheval de bataille.

La prise en charge du comportement neuromusculaire de la sphère orofaciale, de la déglutition, de la ventilation et de l'articulation de la parole nécessite une approche globale du patient et le partenariat de différents thérapeutes (orthodontiste, chirurgien-dentiste, stomatologue, chirurgien maxillo-facial, occlusodontiste, parodontologue...). C'est la condition première d'une oralité positive dans l'univers médical et paramédical. En gardant tous en tête que la langue est un outil multifonctions précoce et précieux.

De la succion-déglutition réflexe à la praxie de mastication

Au commencement était la langue. Les premiers mouvements antéropostérieurs de succion, puis de déglutition, apparaissent en effet au cours du troisième mois de l'embryogenèse.

Le fœtus déglutit le liquide amniotique, rode et entraîne le réflexe de succion-déglutition pendant tout le reste de vie intra-utérine. Ce système réflexe doit être mature à la



© Cécile Gaudowski

la langue est reine en son palais

naissance. Au cours de la construction de l'être humain, l'oralité alimentaire et l'oralité verbale paraissent intimement liées vis-à-vis de leur nécessité fonctionnelle.

L'oralité primaire

À la naissance, la fonction de succion et de déglutition est assurée grâce au tronc cérébral. La langue est constamment en position horizontale dans la cavité buccale, la pointe entre les crêtes gingivales, souvent même entre les lèvres. Les premiers schémas moteurs de la langue sont les mouvements antéro-postérieurs en rapport avec la posture de décubitus et de flexion du nourrisson.

Le réflexe de succion est déclenché par toutes les stimulations des lèvres, de la muqueuse prémaxillaire et de la langue.

L'oralité secondaire

La double stratégie alimentaire associe le biberon et la cuillère. Ce passage à la cuillère nécessite la maturité du cortex cérébral. La langue dispose, alors, de plus d'espace dans la cavité buccale, sa partie postérieure devient mobile.